

Enerzair

藥品學名	Indacaterol 150 mcg /glycopyrronium 50 mcg/ mometasone furoate 160 mcg
商品名	英文：Enerzair Breezhaler，中文：艾能舒吸入膠囊
劑型含量	1cap QD inhalation
廠牌	Novartis
許可證字號	衛部菌疫輸字 028049 號
藥理作用	支氣管擴張:LABA+LAMA，抗發炎:ICS (三合一吸入劑)
適應症	適用於併用吸入性長效型 β_2 - 腎上腺受體作用劑和吸入性皮質類固醇治療氣喘仍控制不佳的成年病人，做為 氣喘維持治療 。
用法用量	1 cap QD INHL
肝腎功能劑量調整	輕到中度腎功能不全：不需調整劑量，重度腎功能不全:預期效益高於潛在風險時使用。 輕到中度肝功能不全：不需調整劑量，重度肝功能不全:預期效益高於潛在風險時使用。
懷孕分級	無資料
藥物動力學	吸收:身體可用率 indacaterol 45%；glycopyrronium 40%；mometasone 10% 分布：蛋白結合率 indacaterol 94-95%；glycopyrronium 38-41%；mometasone 98-99% 代謝：indacaterol 經化作用；glycopyrronium 經化作用；mometasone CYP 3A4 排泄：indacaterol 糞便為主；glycopyrronium 腎臟 60-70%；mometasone 糞便 74% 半衰期：indacaterol 40-52 h；glycopyrronium 33-57 h；mometasone 4.5 h
禁忌	對任一成分過敏者
注意事項	1. 下列患者慎用：心血管疾病、癲癇、甲狀腺毒症、狹角性青光眼、尿滯留者、腎功能不全、肺結核、有慢性感染或感染未治療者。 2. 不得作為急性氣喘之治療藥物。 3. 不建議突然停藥。 4. 使用吸入劑後需漱口。
副作用	氣喘惡化、鼻咽炎、上呼吸道感染、頭痛。
健保類別	健保限制藥品： (1)適用於併用吸入性長效型 β_2 -腎上腺受體作用劑和吸入性皮質類固醇治療氣喘仍控制不佳，且在過去一年至少發生一次急性惡化的成人，做為氣喘維持治療。 (2)每月限用 1 盒
藥品儲存	室溫<30°C
藥品外觀	