

Epoetin alfa

藥品學名	Epoetin alfa
商 品 名	英文：Eprex，中文：宜保利血
劑 型 含 量	2000 IU/0.5 mL
廠 牌	嬌生
許可證字號	衛署菌疫輸字第 000582 號
藥 理 作 用	醣蛋白荷爾蒙：刺激紅血球生成作用
適 應 症	治療與慢性腎臟功能失調有關的貧血症狀或因此而需要輸血之患者，治療與癌症化學治療有關的症狀性貧血。
用 法 用 量	初劑量：50 IU/kg TIW IV/SC，每四週可增量 25 IU/kg/次，維持 Hb 10-12 g/dl 維持劑量：每週劑量 75-300 IU/kg，維持 Hb 10~12 g/dl
腎功能劑量調整	無
懷 孕 分 級	C 級
藥物動力學	半衰期：4-13 hrs
禁 忌	1. 對本品任一成分過敏 2. 未控制之高血壓 3. 曾使用過任何紅血球生成素，且發生紅血球發育不良者 4. 含有苯甲醇做為防腐劑，孕婦、授乳婦、嬰兒禁用
注 意 事 項	1. 下列患者慎用：心血管疾病、高血壓、癲癇、慢性肝衰竭、血小板增多症、孕婦、授乳婦、Hb>12 g/dl、嚴重貧血者 2. 癌症患者可能增加死亡或腫瘤惡化或復發風險 3. 兩週內 Hb 增加速度>1 g/dl，會增加心血管疾病死亡之風險 4. 監測 Hct/Hb、血壓、iron status、potassium、platelet 5. 血液透析者對 heparin 之須求可能增加，以避免透析系統阻塞 6. 皮下注射限用於無法使用靜脈注射者
副 作 用	皮膚搔癢/紅疹、噁心、嘔吐、關節痛、頭痛、高血壓、發燒
健保類別	健保限制藥品
健保規定	詳見 EPO 健保給付規定
健 保 價	396 元
藥 品 儲 存	儲存於冷藏 2~8°C,需避光
藥 品 辨 識	