

Evicel Fibrin Sealant

| | |
|----------|---|
| 藥品學名 | Evicel fibrin sealant |
| 商品名 | 英文：Efient · 中文：愛微止纖維蛋白凝合劑組 1 ml, 2 ml |
| 劑型含量 | 1 ml of human fibrinogen :50-90 mg , 2 ml of human fibrinogen :100-180 mg 1 ml of human thrombin : 800-1200 IU, 2 ml of human thrombin : 1600-2400 IU |
| 廠牌 | Omrix Biopharmarmaceuticals |
| 許可證字號 | 衛署菌疫輸字第 000910 號 |
| 藥理作用 | 人類纖維蛋白凝合劑；fibrinogen:為可凝固蛋白的濃縮物，thrombin:可凝固蛋白結合酵素，兩者混合可以立即凝固，手術時使用，形成一成薄膜密封組織以止血。 |
| 適應症 | 用於手術中使用標準外科止血技術仍無法有效控制出血時之輔助性治療，協助止血 |
| 用法用量 | 依臨床需要調整，血管手術的每次用量最高為 4 ml，腹膜腔後或腹腔內手術的每次用量最高為 10 ml，必要時可重複使用。 |
| 肝腎功能劑量調整 | 肝腎功能不全:無需調整劑量 |
| 懷孕分級 | 無資料 |
| 藥物動力學 | 局部使用，未做人體血管試驗，無資料 |
| 禁忌 | 對活性成分或賦形劑過敏者。 |
| 注意事項 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 僅限使用於創傷表面，勿血管內投予使用。 2. 僅塗抹薄薄的一層即可，過多的凝塊厚度可能對產品功效與傷口癒合過程產生負面影響。 3. 每次使用務必紀錄產品名稱及批號。 4. 使用時須監測血壓、脈搏、血氧濃度。 5. 儲存時玻璃瓶需直立放置，存放於原包裝盒內以避免光照，切勿重複冷凍。 |
| 副作用 | 腹部感染、血腫、周邊水腫、血紅素下降 |
| 健保類別 | 自費藥品 |
| 自費價 | 1ml: 21300 元，2ml :35800 元 |
| 藥品儲存 | 儲存於小於-18℃冷凍庫，解凍後，尚未開封藥瓶 2-8℃可以儲存達 30 天，這段期間不可再次冷凍，必須在期限內使用完畢，否則應予以丟棄。纖維蛋白原與凝血成分在室溫下可保持穩定達 24 小時，但抽出至專用給藥裝置後，必須立即使用。 |
| 藥品外觀 |  |
| 系統管控 | 限自費使用 |