

## 異動原因：更換外觀

|           |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 成 分 名     | <b>Fentanyl</b>                                                                    |                                                                                     |
| 含 量 / 劑 型 | 25mcg/小時/片                                                                         |                                                                                     |
| 品 項       | 新 品                                                                                | 舊 品                                                                                 |
| 藥 品 外 觀   |  |  |
| 商 品 名     | <b>Fentanyl</b>                                                                    |                                                                                     |
| 中 文 名     | 吩坦尼穿皮貼布                                                                            |                                                                                     |
| 廠 牌       | 衛生福利部食品藥物管理署                                                                       |                                                                                     |
| 健 保 碼     | <b>A050018311</b>                                                                  |                                                                                     |
| 許 可 證 字 號 | 衛署藥製字第 050018 號                                                                    |                                                                                     |
| 適 應 症     | 類鴉片製劑控制的慢性疼痛和頑固性疼痛                                                                 |                                                                                     |
| 用 法 用 量   | 25-300 mcg/小時 每 3 天一次                                                              |                                                                                     |
| 副 作 用     | CNS 抑制、呼吸抑制、胃腸不適、低血壓、<br>皮膚局部反應                                                    |                                                                                     |