

Finerenone

藥 品 學 名	Finerenone
商 品 名	英文：Kerendia，中文：可申達
劑 型 含 量	20 mg/tab
廠 牌	Bayer
許 可 證 字 號	衛部藥輸字第 028326 號
藥 理 作 用	Finerenone 是礦物性皮質素受體(MR)的非類固醇選擇性拮抗劑。Finerenone 在上皮(例如腎臟)和非上皮(例如心臟和血管)組織中阻斷 MR 介導的鈉再吸收和 MR 過度活化。MR 過度活化被認為與纖維化和發炎有關。
適 應 症	用於第二型糖尿病相關的慢性腎臟病(CKD)的成年病人，可降低持續性腎絲球過濾率(eGFR)下降、末期腎病、心血管死亡、非致命性心肌梗塞以及因心衰竭住院的風險。
用 法 用 量	eGFR ≥60 ml/min: 20 mg QD PO
肝 腎 功 能 劑 量 調 整	肝功能不全：重度肝功能不全避免使用 腎功能不全：eGFR <60 至 ≥25 ml/min 起始劑量：10mg QD，eGFR <25:不建議開始使用。 若治療過程中病人進展至末期腎病(eGFR <15 mL/min)，需停用 Kerendia 治療
懷 孕 分 級	C。
藥 物 動 力 學	吸收：身體可用率 44% 分布：蛋白結合率 92%，代謝：CYP3A4 (90%) 排除：尿液 80%，糞便 20% 半衰期：2-3h。
禁 忌	病人接受強效CYP3A4抑制劑併用治療(如clarithromycin)、患有腎上腺功能不全
注 意 事 項	1. 下列患者慎用：高血鉀。 2. 治療前測量所有病人的血清鉀濃度和 eGFR 並相應給藥。 3. 服用本藥治療期間避免吃葡萄柚或葡萄柚汁。
交 互 作 用	Rifampin、rifabutin、Atripla、cimetidine、verapamil、amiodarone、diltiazem、clarithromycin、phenytoin、carbamazepine、fluconazole、ciprofloxacin
副 作 用	高血鉀、低血壓、低血鈉。
健 保 類 別	自費藥品
藥 品 儲 存	<30°C 以下儲存。
總 結	用於第二型糖尿病患者的慢性腎臟病治療，可以延緩腎臟病惡化、降低心血管風險，自費使用。
藥 品 外 觀	