

Fluticasone propionate

藥品學名	Fluticasone propionate					
商品名	英文：Cutivate 中文：克廷膚					
劑型含量	0.05% 5 g/tube					
廠牌	GSK 葛蘭素史克藥廠					
許可證字號	衛署藥輸字第 023773 號					
藥理作用	局部皮質類固醇：具抗發炎作用。					
衛生署核可適應症	緩解皮膚病之發炎以及搔癢症狀。如:溼疹、包括異位性、初期和盤狀溼疹;結節性癢疹;乾癬(不包括廣泛性板塊之乾癬);神經性皮膚炎、包括單純苔癬;扁平苔癬、脂漏性皮膚炎、接觸性過敏反應、圓盤狀紅斑性狼瘡、一般性紅皮症全身性類固醇治療之輔助治療、螫刺症、汗疹(痱子)。					
用法用量	每天一或二次塗抹患部					
懷孕分級	C					
藥物動力學	吸收：－ 分布：－ 代謝：肝臟（CYP 3A4） 排泄：膽汁 半衰期：7.2 hrs					
禁忌	對本品任一成分過敏者					
注意事項	本品不宜用於： 未治療的皮膚感染、酒渣鼻、尋常痤瘡、口周圍之皮膚炎、肛門/陰道周圍的搔癢症、未發炎的皮膚搔癢、三個月以下嬰兒的皮膚炎/尿布疹					
副作用	搔癢、局部皮膚灼熱感					
健保類別	健保給付藥品					
健保規定	—					
健保價	44.9 元					
藥品儲存	儲存於 30℃ 以下					
總結	院內類固醇軟膏單方共 4 種					
	商品名	Cutivate	Dermovate	Topsym	Cort. S.	Elomet
	學名	Fluticasone propionate	Clobetasol propionate	Fluocinonide	Hydrocortisone acetate	Mometasone furoate
	劑型含量	0.05% cream 5 g/tube	0.05% oint 5 g/tube	0.05% oint 10 g/tube	1% oint 50 g/bot	0.1% cream 5 g/tube
	建議劑量	每日 1-2 次	每日 1-2 次	每日 1-3 次	每日 1-2 次	每日 1 次
	健保價(元)	44.9	38.8	75	54	49.4
	強度分類	Intermediate	Very high	High	Low	Intermediate
	月用量	新藥	96	59	75	280
	* Drug information handbook 外用類固醇製劑依強度分為四級： Very high/ High/ Intermediate/ Low					