

Lidocaine/Prilocaine

藥 品 學 名	Lidocaine/Prilocaine
商 品 名	英文：Fortacin Cutaneous Spray，中文：賦久勁外用噴霧劑
劑 型 含 量	每 ml：Lidocaine 150mg / Prilocaine 50 mg，每次按 3 下(內含 22.5 mg lidocaine+7.5 mg prilocaine)
廠 牌	英國 Pharmaserve 廠
許 可 證 字 號	衛署藥輸字第 027989 號
藥 理 作 用	提供局部麻醉的效果，阻斷龜頭內神經脈衝的傳導，進而降低龜頭的敏感度
適 應 症	治療成年男性之原發性早發性射精
用 法 用 量	按 3 下藥劑覆蓋於龜頭
肝 腎 功 能 劑 量 調 整	不需調整劑量
懷 孕 分 級	-
藥 物 動 力 學	分布：Protein binding: Lidocaine：66%；Prilocaine：55% 代謝：Lidocaine & Prilocaine：Hepatic: Via CYP3A4 排除：Lidocaine：尿液；Prilocaine：尿液 半衰期：Lidocaine 65-150 min / Prilocaine 10-150 min
禁 忌	患者或伴侶對本品過敏、對醃胺類局部麻醉劑過敏
注 意 事 項	1. 下列患者慎用：葡萄糖-6-磷酸脫氫酶缺乏症、先天性或特發性變性血紅素血症、使用 amiodarone 之病人、重度肝功能不全。 2. 避免噴到眼睛。 3. 可能會使聚氨酯類的保險套變質。 4. 第一次使用，需短暫搖晃，並朝空中噴三下，往後每次使用搖晃後，空噴一下。 5. 應在性交前 5 分鐘噴上噴霧，5 分鐘後盡可能抹去洗淨龜頭。
副 作 用	生殖器感覺減弱、勃起功能障礙、陰戶陰道灼熱感
健 保 類 別	自費藥品
藥 品 儲 存	25°C 以下儲存
藥 品 外 觀	