

## 異動原因：更換廠商

| 成 分 名     | <b>Griseofulvin</b>                                                                |                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 品 項       | 新 品                                                                                | 舊 品                                                                                 |
| 含 量 / 劑 型 | 250 mg/tab                                                                         | 500 mg/tab                                                                          |
| 藥 品 外 觀   |  |  |
| 商 品 名     | Griseofulvin                                                                       | Fuyou                                                                               |
| 中 文 名     | 灰黴素                                                                                | 膚友                                                                                  |
| 廠 牌       | 元宙                                                                                 | 瑞士                                                                                  |
| 健 保 碼     | AC24375100                                                                         | A028055100                                                                          |
| 許 可 證 字 號 | 衛署藥製字第 024375 號                                                                    | 衛署藥製字第 028055 號                                                                     |
| 適 應 症     | 甲癬、髮癬不適宜局部外用治療或<br>局部外用無故的皮膚黴菌感染                                                   |                                                                                     |
| 用 法 用 量   | 甲癬 1000 mg 一天一次<br>其他皮膚黴菌感染 500 mg 一天一次                                            |                                                                                     |
| 副 作 用     | 皮疹、頭痛、眩暈、失眠、行為障礙、<br>腸胃不適                                                          |                                                                                     |