

Lidocaine Hydrochloride/Chlorhexidine digluconate

藥 品 學 名	Lidocaine Hydrochloride / Chlorhexidine digluconate	
商 品 名	英文：Instillagel，中文：英施妥樂凝膠	
劑 型 含 量	Lidocaine hydrochloride：20 mg/g，Chlorhexidine digluconate 2.5 mg/g，11ml/syr	
廠 牌	瑞謙	
許 可 證 字 號	衛部藥輸字第 028541 號	
藥 理 作 用	Lidocaine 阻斷神經細胞鈉離子通道，抑制神經衝動傳導而產生局部麻醉作用；Chlorhexidine 破壞細菌細胞膜，具有廣效殺菌作用。	
適 應 症	對黏膜具有潤滑、局部麻醉和消毒作用	
用 法 用 量	1. 導尿：常規清潔龜頭和尿道外口後，將本藥品 6-11mL 緩慢滴入尿道，輕壓龜頭，直至產生局部麻醉和消毒效果。 2. 膀胱鏡和內視鏡檢查：無痛地導入醫療器材，包括外括約肌在內的整個尿道必須塗上一層潤滑劑並進行麻醉。陰莖短，尿道相應狹窄，11mL 的劑量即可；在其他情況下，必要時可額外滴入本藥品 6-11mL。 3. 尿道結構（狹窄處、探條(bouginage)）：滴入本藥品 11mL，必要時再滴入，並使用陰莖夾。5-10 分鐘後獲得所需的尿道麻醉。 4. 消毒用：請將凝膠均勻塗抹（注入）在黏膜上。	
肝 腎 功 能 劑 量 調 整	肝功能不全：中重度肝功能不全的患者可考慮減量 腎功能不全：不須調整劑量	
懷 孕 分 級	B (仿單:懷孕前 3 個月，絕對必要才使用)	
藥 物 動 力 學	1.Lidocaine 吸收：Bioavailability：無資料 分布：Protein binding: 65% 代謝：主要肝臟代謝 排除：Renal: <10% unchanged 半衰期：1.6 hrs	2.Chlorhexidine 吸收：Bioavailability：Little or none 分布：無資料 代謝：無資料 排除：糞便排除: 90% 半衰期：無資料
禁 忌	1.已知對lidocaine和其他醯胺類(amide type)局部麻醉劑過敏者。 2.有明顯傳導系統(conduction system)失調的病人， 3.二歲以下兒童。	
注 意 事 項	1.下列患者慎用：肝功能不全、心臟病人、癲癇病人。 2.不可接觸眼睛 3.局部麻醉和消毒作用在 5 分鐘後產生藥效。 4.哺乳:給藥後 12 小時再進行哺乳	
交 互 作 用	Propranolol、propofol、Mexiletine、Propafenone	

G6PD/青光眼	NA	
副作用	血壓下降、局部過敏反應	
健保類別	自費藥品	
藥品儲存	25°C 以下儲存。本藥品僅供單次使用。	
藥品外觀		