

Janumet

藥品學名	Sitagliptin/Metformin		
商品名	英文：Janumet 中文：捷糖穩		
劑型含量	每 tab 含：Sitagliptin 50 mg、Metformin 500 mg		
廠牌	默沙東		
許可證字號	衛署藥輸字第 025043 號		
藥理作用	Sitagliptin：Dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) 抑制劑 Metformin：降低肝臟葡萄糖的生成、減少小腸對葡萄糖的吸收並藉由提高末梢組織對葡萄糖的攝取與利用，增進胰島素的靈敏度。		
衛生署核可適應症	適用於配合飲食和運動，以改善下列第二型糖尿病患者的血糖控制： 已接受 sitagliptin 和 metformin 合併治療者，或單獨使用 sitagliptin 或 metformin，但血糖控制不佳者。		
用法用量	1 tab bid，極量：2 tab/day		
腎功能劑量調整	腎功能不全(男性 Scr $\geq$ 1.5 mg/dl、女性 Scr $\geq$ 1.4 mg/dl)不宜使用		
懷孕分級	B 級		
藥物動力學	吸收：生體可用率 Sitagliptin 87%、Metformin 50-60%		分布：蛋白質結合 Sitagliptin 38%、Metformin negligible
	代謝：Sitagliptin 肝臟 (minimal)	排泄：Sitagliptin 腎臟 87% Metformin 腎臟 90%	半衰期：Sitagliptin 12.4 hr Metformin 1.5~6.2 hr
禁忌	腎功能不全(男性 Scr $\geq$ 1.5 mg/dl、女性 Scr $\geq$ 1.4 mg/dl)、使用血管內注射含碘顯影劑、急性或慢性代謝性酸中毒，包括糖尿病酮酸血症。		
注意事項	1.服用後若發生胰臟炎，應立即停藥。 2.服藥期間應避免過度飲酒。 3.進行需要禁食的外科手術時，應暫時停藥，待患者恢復飲食且重新評估腎功能確定正常後才可開始用藥。 4.藥物交互作用：cimetidine、ciprofloxacin、levofloxacin		
副作用	頭痛、鼻咽炎、肌肉無力、Vit. B12 降低、腹瀉、急性胰臟炎、Stevens-Johnson syndrome		
健保類別	健保給付藥品		
健保規定	無		
健保價	16.1 元		
藥品儲存	30℃ 以下		
藥品辨識			