

Kombiglyze XR

藥品學名	Saxagliptin/Metformin		
商品名	英文：Kombiglyze XR 中文：康併莎		
劑型含量	每 tab 含：Saxagliptin 5 mg、Metformin 1000 mg (extended-release)		
廠牌	BMS		
許可證字號	衛署藥輸字第 025453 號		
藥理作用	Saxagliptin：Dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) 抑制劑 Metformin：降低肝臟葡萄糖的生成、減少小腸對葡萄糖的吸收並藉由提高末梢組織對葡萄糖的攝取與利用，增進胰島素的靈敏度。		
衛生署核可適應症	適用於配合飲食和運動，以改善下列第二型糖尿病患者的血糖控制： 已接受 saxagliptin 和 metformin 合併治療者，或單獨使用 saxagliptin 或 metformin，但血糖控制不佳者。		
用法用量	1 tab once daily		
腎功能劑量調整	腎功能不全(男性 Scr \geq 1.5 mg/dl、女性 Scr \geq 1.4 mg/dl)不宜使用。		
懷孕分級	B 級		
藥物動力學	吸收：Saxagliptin No data Metformin 生體可用率 50-60%		分布：蛋白質結合 Saxagliptin/Metformin：negligible
	代謝：Saxagliptin 肝臟 CYP3A4/5	排泄：Saxagliptin 腎臟 60% 糞便 22% Metformin 腎臟 90%	半衰期：Saxagliptin 2.5 hr Metformin 1.5~6.2 hr
禁忌	腎功能不全(男性 Scr \geq 1.5 mg/dl、女性 Scr \geq 1.4 mg/dl)、使用血管內注射含碘顯影劑、急性或慢性代謝性酸中毒，包括糖尿病酮酸血症。		
注意事項	1.本品必須整粒吞服，不可磨碎、切割或嚼碎。 2.服用後若發生胰臟炎，應立即停藥。 3.服藥期間應避免過度飲酒。 4.藥物交互作用：ketoconazole、clarithromycin、itraconazole，建議劑量為 2.5mg qd 5.進行需要禁食的外科手術時，應暫時停藥，待患者恢復飲食且重新評估腎功能確定正常後才可開始用藥。		
副作用	腹瀉、頭痛、鼻咽炎、Vit. B12 降低、低血糖、急性胰臟炎、血管水腫。		
健保類別	健保給付藥品		
健保規定	無		
健保價	28.7 元		
藥品儲存	儲存於 30°C 以下		
藥品辨識			

