

Levocetirizine

藥品學名	Levocetirizine				
商品名	英文:Levozine		中文:舒敏寧		
劑型含量	5 mg/tab				
廠牌	生達				
許可證字號	衛署藥製字第 049833 號				
藥理作用	抗組織胺				
衛生署核可適應症	治療成人及六歲以上孩童因過敏性鼻炎、慢性蕁麻疹等所引起的各種過敏徵狀				
用法用量	>6 y/o 孩童及成人:5mg QD				
懷孕分級	B 級				
藥物動力學	吸收：口服 85 % 分布：蛋白質結合率 95 % 代謝：肝<14 % 排泄：腎臟 85.4 % 半衰期：7-9 小時				
禁忌	嚴重腎功能障礙(Clcr < 10 min/ml)。				
注意事項	1. 六歲以下孩童不建議使用 2. 對於 galactose 無耐受力、Lapp lactase 缺乏或有 glucose-galactose 吸收障礙等遺傳疾病不建議使用				
副作用	嗜睡、頭痛、口乾、無力				
健保類別	健保給付藥品				
健保規定	-				
健保價	9.2 元				
藥品儲存	儲存於 25 °C 以下				
總結	院內第二代 antihistamine 之比較：				
	類別	Piperazines		Piperidines	
	學名	Levocetirizine 5mg	Cetirizine 10mg	Desloratadine 5 mg	Fexofenadine 60 mg
	商品名	Levozine Tab	Cetin Tab	Denosin Tab	Allegra Tab.
	廠牌	生達	南光	美時	賽諾菲安萬特
	月用量	新藥申請	14761	263	6626
	健保價(元)*	9.2 ^②	1.7 ^①	9.7 ^①	4.89 ^③
	成人劑量	1 tab QD	1-2 tab QD	1 tab QD	1 tab BID
	每日藥費(元)	9.2	1.7-3.4	9.7	9.78
	兒童劑量				
	FDA	>6 y/o	>2 y/o	>6 m	>6 y/o
	產品仿單	>6 y/o	>6 y/o	>12 y/o	>6 y/o
	Half-life (h)	7-9	7.4-9	19-40	14.4
	Onset	<1h	20mins	-	1-3h
	懷孕分期	B	B ¹	C	C
	鎮靜副作用	±	+	±	±