

Lorcaserin

藥品學名	Lorcaserin HCl
商品名	英文：Belviq，中文：沛麗婷膜衣錠
劑型含量	10 mg/tab
廠牌	創益生技
許可證字號	衛署藥輸字第 027218 號
藥理作用	Serotonin 5-HT _{2c} 受體致效劑
適應症	BELVIQ 是血清素 5-HT _{2c} 受體致效劑，對成人身體質量指數 (BMI) 過高者於飲食和運動控制後之長期體重輔助管理。適用之身體質量指數為：(1) BMI ≥ 30 kg/m ² 或 (2) BMI ≥ 27 kg/m ² 且有一項與體重相關之疾病 (例如：高血壓、血脂異常或第二型糖尿病)。
用法用量	10mg BID PO
肝腎功能劑量調整	輕度腎功能不全：不須調整劑量，中度腎功能不全：小心使用，重度腎功能不全：不建議使用。 輕中度肝功能不全：不須調整劑量，重度肝功能不全：不建議使用。
懷孕分級	X
藥物動力學	分布：蛋白結合率 70% 代謝：肝 排泄：腎 92.3%，糞便 2.2% 半衰期：11.9 h
禁忌	懷孕
注意事項	1. 下列患者慎用：心搏過慢、A-V blocker 病史者 (>first degree)、認知損傷、心衰竭、陰莖勃起異常者、嚴重腎功能不全、心臟瓣膜疾病、使用胰島素或促胰島素分泌製劑的第二型糖尿病患者。 2. 藥物交互作用：dextromethorphan、fentanyl、mirtazapine、duloxetine、morphine、venlafaxine、paroxetine、imipramine。 3. 使用達 12 週時，需進行療效的評估，如果體重減少未達 5%，則建議停止服用。
副作用	頭痛、頭暈、胃腸不適、口乾、乏力
健保類別	自費
自費價	60 元
藥品儲存	30°C 以下
藥品外觀	