

## 異動原因：更換劑量

| 成 分 名     | <b>Mesalazine</b>                                                                 |                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 品 項       | 新 品                                                                               | 舊 品                                                                                |
| 藥 品 外 觀   |  |  |
| 含 量 / 劑 型 | 1600mg/錠                                                                          | 800mg/錠                                                                            |
| 商 品 名     | Asacol                                                                            | Asacol                                                                             |
| 中 文 名     | 阿腸克                                                                               | 阿腸克                                                                                |
| 廠 牌       | 科懋                                                                                | 科懋                                                                                 |
| 健 保 碼     | BC28206100                                                                        | BC24611100                                                                         |
| 許 可 證 字 號 | 衛部藥輸字第 028206 號                                                                   | 衛署藥輸字第 024611 號                                                                    |
| 適 應 症     | 潰瘍性結腸炎                                                                            |                                                                                    |
| 用 法 用 量   | 治療劑量：4800mg/天，分 1~3 次使用                                                           |                                                                                    |
| 副 作 用     | 胃腸不適、皮疹、頭痛、眩暈、關節神經痛、心臟敏感反應、肝腎功能不全、腎炎                                              |                                                                                    |