

Nicotine polacrilex

藥 品 學 名	Nicotine polacrilex
商 品 名	英文：Nicodin lozenges，中文：戒菸樂
劑 型 含 量	4 mg/ 口含錠
廠 牌	黃氏
許 可 證 字 號	衛署藥製字第 057338 號
藥 理 作 用	尼古丁選擇性地與自主神經節、腎上腺髓質、神經肌肉接點和大腦中菸鹼乙醯膽鹼受體結合。主要透過對大腦皮層產生興奮作用，並在邊緣系統產生獎勵(reward)作用，進而影響中樞神經系統。低劑量時，主要是興奮作用；高劑量時，以獎勵作用為主。
適 應 症	戒菸輔助劑。
用 法 用 量	初期使用(第 1~6 週)：每 1~2 小時/1 片，逐步減量使用 第 7~9 週：每 2~4 小時/1 片 第 10~12 週：每 4~8 小時/1 片 有強烈慾望想要抽菸時，服用口含錠，能持續有效戒菸 12 週 初期使用一天至少使用 9 次。一次不可超過一顆，且一天不可超過 15 次。
肝腎功能劑量調整	肝功能不全：NA。 腎功能不全：NA。
懷 孕 分 級	C
藥 物 動 力 學	吸收：Bioavailability：30% 分布：Protein binding：Less than 5% 代謝：主要由肝臟代謝 排除：尿液 10% - 30% (unchanged) 半衰期：1~2hr
禁 忌	無
注 意 事 項	1. 下列病人慎用：心血管疾病、甲狀腺亢進、嗜鉻細胞瘤、第一型糖尿病、中重度肝腎功能不全、腸胃潰瘍、孕婦及哺乳婦、苯丙酮酸尿症。 2. 勿連續使用超過 24 週。 3. 使用口含錠時，將一顆口含錠置入口內，在口腔兩側移動，直到溶解為止。此動作需持續 20~30 分鐘，直到完全溶解，不可以咀嚼或吞服。 4. 使用 15 分鐘前，請避免喝酸性飲料，如咖啡或汽水。使用中，請勿飲食，可能會影響 Nicotine 的吸收。 5. 若一次使用太多口含錠，可能會開始感覺噁心、頭暈及不適。 6. 不可同時使用其他含尼古丁產品，如戒菸口香糖或戒菸貼片。
交 互 作 用	無

G6PD/青光眼	無
副作用	頭暈、暈眩、頭痛、失眠、噁心、腸胃不適、口腔刺激。
健保類別	戒菸輔助補助藥品。
藥品儲存	<25°C以下
藥品外觀	