

Donepezil

藥品學名	Donepezil
商品名	英文：Nepes · 中文：內貝思
劑型含量	10mg/tab
廠牌	健亞
許可證字號	衛部藥製字第 051718 號
藥理作用	可逆性抑制乙醯膽素酯酶水解作用，增加乙醯膽素濃度，而加強膽素性神經之功能。
適應症	阿滋海默症
用法用量	0.5-1 tab QD
肝腎功能劑量調整	無資料
懷孕分級	Fetal risk cannot be ruled out.)(C)
藥物動力學	吸收：生體可用率 100% 分布：protein binding 96 % 代謝：肝臟 排除：腎臟 57%；糞便 9-15%。 半衰期：70h
禁忌	對本品成分或 piperidine 衍生物過敏
注意事項	1. 下列患者慎用：有暈厥史的老年人、潰瘍史、氣喘、阻塞性肺病。 2. 藥物交互作用:fluconazole、oxybutynin、metronidazole、haloperidol、imipramine、prochlorperazine、hydroxychloroquine、tamoxifen、trazodone、propafenone、famotidine、ciprofloxacin、octreotide、azithromycin、clarithromycin、venlafaxine、risperidone、levofloxacin、moxifloxacin、voriconazole、amiodarone、quetiapine、sulpride、duloxetine、theophylline、baclofen、tramadol、oxacillin、dicloxacillin、ampicillin、atropine、isoniazide。
副作用	胃腸不適、失眠、肌肉痙攣
健保類別	健保限制藥品
健保價	61 元
藥品儲存	<25°C以下
總結	
系統管控	限神經科或精神科醫師，適應症勾選