Rosuvastatin

藥	品	學	名	Rosuvastatin Calcium
商	П		名	英文:Crestor,中文:冠脂妥膜衣錠
劑	型	含	量	10 mg
廠			牌	阿斯特捷利康
許	可該	登字	號	衛署藥輸字第 024131 號
藥	理	作	用	HMG-CoA 還原酶抑制劑:抑制膽固醇的生成,以達降血脂的作用
適	K	焦	症	高膽固醇血症、高三酸甘油脂血症
用	法	用	量	10-20 mg QD
肝	腎	功	能	腎功能(Ccr<30 mL/min/1.73 m²):5-10 mg QD
劑	量	調	整	肝功能不全:禁用於活動性肝病之患者
懷	孕	分	級	Fetal risk cannot be ruled out
藥	物重	助力	學	吸收:生體可用率 20%
				分布:蛋白結合率 88%
				代謝:CYP2C9 10%
				排泄:腎臟排泄 10-28%、糞便排除 90%
				半衰期:19 h
禁			忌	孕婦、授乳婦、有活動性肝病、不明原因的血清氨基轉移酵素持續上升
注	意	事	項	1.下列患者慎用: 肝疾病史、腎功能不全、持續不明原因的蛋白尿、酒癮、老人、
				甲狀腺低下。
				2.血清氨基轉移酵素高於正常上限值的3倍,需降低劑量或停藥。
				3. 藥物交互作用:daptomycin、fenofibrate
副	1	乍	用	頭痛、肌肉疼痛、腹痛、衰弱無力、噁心、眩暈、肝毒性
健	保	類	別	健保限制藥品
自	乽	貴	價	25 元
藥	品	儲	存	<30℃以下
藥	品	外	觀	(cm) 0 1