

Peramivir

藥品學名	Peramivir
商品名	英文：Rapiacta for intravenous drip，中文：瑞貝塔
劑型含量	300 mg/60 ml/bag
廠牌	鹽野義
許可證字號	衛署藥輸字第 026649 號
藥理作用	抑制流感病毒 A、B 型之神經胺酸酶，因而抑制病毒增殖
適應症	治療成人 A 型及 B 型流感病毒急性感染
用法用量	300 mg 或 600 mg single dose IV drip 住院病人：300 mg bid 或 600 mg qd×5 天，症狀未改善續用 600 mg qd×5 天(共 10 天)
肝腎功能劑量調整	腎功能不全： 50>Ccr≥30 ml/min：100 mg stat 30>Ccr≥10 ml/min：50 mg stat 透析患者於透析後給藥
懷孕分級	C 級
藥物動力學	分布：蛋白質結合率 30% 排泄：尿液 90% 半衰期：20 h
禁忌	對本藥過敏者
注意事項	1. 腎功能不全者應調整用法用量。 2. 藥物交互作用：influenza virus vaccine。 3. 投與時間建議每 300 mg 大於 15 分鐘。 4. 宜在流感症狀 48 小時內投與。
副作用	胃腸不適、嗜中性白血球降低、蛋白尿、精神神經症狀、肝功能異常
健保類別	自費
自費價	1800 元
藥品儲存	25℃ 以下
外觀	