

Pitavastatin

| | |
|----------|---|
| 藥品學名 | Pitavastatin |
| 商品名 | 英文：Zulitor，中文：平脂 |
| 劑型含量 | 4 mg/tab |
| 廠牌 | 友華生技 |
| 許可證字號 | 衛署藥製字第 058639 號 |
| 藥理作用 | HMG-CoA 還原酶抑制劑：減少肝臟膽固醇生成 |
| 適應症 | 原發性高膽固醇血症及混合型血脂異常 |
| 用法用量 | 1~4 mg qd |
| 肝腎功能劑量調整 | 活動性肝臟疾病禁用 中、重度腎功能不全及血液透析(Ccr< 60 ml/min)：起始劑量 1 mg qd，極量 2 mg qd |
| 懷孕分級 | X |
| 藥物動力學 | 吸收：生體可用率 51% 分布：蛋白結合率 99% 代謝：肝 Glucuronidation 排泄：糞便 79% 腎 15% 半衰期：11 h |
| 禁忌 | 活動性肝臟疾病、不明原因轉胺酶升高、懷孕、哺乳 |
| 注意事項 | 1. 下列患者慎用：酗酒、曾有肝臟疾病史、腎功能不全、甲狀腺低下 2. 藥物交互作用：Colchicine、Clarithromycin、Fenofibrate、Niacin、Rifampin |
| 副作用 | 頭痛、倦怠、胃腸不適、肌肉疼痛、肝指數上升、發疹 |
| 健保類別 | 健保給付藥品 |
| 健保價 | 18.4 元/tab |
| 藥品儲存 | < 25°C 以下 |
| 藥品外觀 |  |

