

Polymyxin B sulfate

藥 品 學 名	Polymyxin B sulfate
商 品 名	英文：Bobimixyn for injection，中文：寶比黴素凍晶注射劑
劑 型 含 量	500,000 units/vial (50 mg)
廠 牌	台灣 東洋
許 可 證 字 號	衛署藥製字第 061557 號
藥 理 作 用	提高細菌細胞膜的通透性，導致細菌死亡，對於絕大多數的革蘭氏陰性桿菌都具殺菌作用
適 應 症	對 Polymyxin B 具感受性且具多重抗藥性之革蘭氏陰性菌引起之嚴重感染成人病人，不適合用於治療泌尿道感染。
用 法 用 量	起始劑量：2-2.5 mg/kg 實際體重 (輸注 60-90 分) 維持劑量：1.25-1.5 mg/kg Q12H Maximum dose：2.5 mg/kg
肝腎功能劑量調整	不須調整劑量
懷 孕 分 級	C
藥 物 動 力 學	吸收：Bioavailability：0% 分布：Protein binding: 78.5%- 92.4% 代謝：無資料 排除：Renal: 0.04%- 4.04% unchanged 半衰期：6 hrs
禁 忌	對本品過敏、重症肌無力患者
注 意 事 項	1.下列患者慎用：併用類箭毒性肌肉鬆弛劑及其他神經毒性藥物。 2.可能會發生困難梭狀芽孢桿菌相關腹瀉(CDAD)。
交 互 作 用	無
G6PD/青光眼	無
副 作 用	腹瀉、腎毒性、神經毒性、腎衰竭、呼吸癱瘓
健 保 類 別	健保限制藥品 健保規定： 1.確定使用於一般抗生素無效，用於患有對 Polymyxin B 具感受性且具多重抗藥性之革蘭氏陰性菌引起之嚴重感染成人病人，不適合用於治療泌尿道感染。 2.需經會診感染科醫師同意後使用，申報費用時需檢附會診紀錄及相關之病歷資料。
健 保 價	652 元
藥 品 儲 存	未開封 25°C 以下儲存，避光儲存

	配製後 2-8°C，72 小時候應丟棄	
系 統 管 控	經會診感染科醫師同意後使用	
藥 品 外 觀		