

Porcaterol oral solution

藥品學名	Procaterol
商品名	英文：Exdila · 中文：喘解液
劑型含量	5 µg/ml, 30 ml/bot
廠牌	晟德
許可證字號	衛署藥製字第 044482 號
藥理作用	選擇性刺激支氣管平滑肌的 β_2 -adrenergic 受體並造成支氣管擴張作用。
適應症	支氣管氣喘、慢性支氣管炎、肺氣腫諸疾患之氣道閉塞性障礙。
用法用量	1. 成人：10ml HS or BID 2. 6 歲以上的孩童：5ml HS or BID 3. 未滿 6 歲的孩童：0.25ml/kg BID or TID。
肝腎功能劑量調整	肝功能不全：NA。 腎功能不全：NA。
懷孕分級	C
藥物動力學	吸收：NA 分布：NA 代謝：CYP3A4 排除：尿液 半衰期：4hr
禁忌	對成份或賦形劑過敏。
注意事項	1. 下列患者慎用：甲狀腺機能亢進、高血壓、心疾患、糖尿病患者、孕婦及哺乳婦。 2. 本劑對 Allergen 引起的皮膚反應有抑制作用，欲實施皮膚試驗時，須在 12 小時前停藥。
交互作用	Dobutamine、Dopamine、Epinephrine、Norepinephrine、Phenylephrine、Theophylline、Aminophylline、Furosemide、Hydrocortisone、Budesonide、Fluticasone、Clobetasol、Cortisone、Dexamethasone、Fluocinonide、Fluorometholone、Methylprednisolone、Mometasone、Prednisolone、Triamcinolone。
G6PD/青光眼	無
副作用	心悸亢進、顏面潮紅、耳鳴、頭痛、胃部不適、口渴、全身倦怠、皮疹。
健保類別	健保給付藥品。
健保價	25.9 元
藥品儲存	<25°C 以下
藥品外觀	