

Pravafen

藥品學名	Pravastatin/fenofibrate
商品名	英文：Pravafen，中文：普脂芬
劑型含量	Pravastatin 40 mg/fenofibrate 160mg
廠牌	SMB Technology
許可證字號	衛署藥輸字第 26169 號
藥理作用	HMG CoA inhibitor/ fibrate 不同機轉降低血脂
適應症	治療混合性高脂血症併有冠心病[或與冠心病風險相當]，且使用 pravastatin 40mg 單一療法可充分控制 LDL 膽固醇之成人病患，在配合飲食控制下，pravafen 可以降低三酸甘油酯及提升 HDL 膽固醇。
用法用量	1 cap 每天晚餐時，隨餐服用。
肝腎功能劑量調整	中度肝功能不全：不建議使用 重度肝功能不全：禁忌 CCr<60 ml/min：禁忌
懷孕分級	X
藥物動力學	吸收：身體可用率 Pravastatin 17%；fenofibrate well 分布：蛋白結合率 pravastatin 50%；fenofibrate 99% 代謝：Pravastatin:肝；fenofibrate: Mild to moderate inhibitor of CYP2C9 排除：Pravastatin Fecal:70%，renal:20%；fenofibrate Fecal:25%, renal:60% 半衰期：Pravastatin:77h；Fenofibrate: 20h
禁忌	嚴重肝功能不全、年齡小於 18 歲、腎功能不全(CCr< 60 ml/min)、已知使用 fibrate 類藥物或是 ketoprofen 時會產生光過敏或光毒性反應、膽結石、急性或慢性胰臟炎(因嚴重高三酸甘油酯血症造成之急性胰臟炎除外)、懷孕、授乳婦、曾因 statin 類或 fibrate 類藥物造成肌肉病變或橫紋肌溶解之病史，或之前使用 statin 類藥物治療時，曾確認肌酸酐磷化激酶(creatine phosphokinase, CK) 值上升至 ULN 的 5 倍以上
注意事項	1. 下列患者慎用:肝臟疾病史、大量飲酒、腎功能不全、老人、甲狀腺低下、肌萎縮性側索硬化症。 2. 使用前監測 CK 值、腎功能、肝功能。
交互作用	Colchicine、fusidic acid、clarithromycin、daptomycin、ezetimibe、warfarin、satin
G6PD/青光眼	無
副作用	胃腸不適、肝指數上升
健保類別	健保限制-全民健康保險降膽固醇藥物給付規範
健保價	14.7 元/顆

藥品儲存	25°C 以下儲存
藥品外觀	