

Pregablin

藥品學名	Pregablin																																									
商品名	英文：Lyrica		中文：利瑞卡																																							
劑型含量	75 mg/cap																																									
廠牌	輝瑞																																									
許可證字號	衛署藥輸字第 024995 號																																									
藥理作用	Gamma-aminobutyric acid (GABA) analog：作用機制尚未完全闡明 1.結合中樞神經系統組織中的 alpha2-delta 部位（電位閘控型鈣離子通道的輔助單元），產生止痛與抗癲癇作用。 2.與源自腦幹的下行正腎上腺素激性通路及血清素激性通路發生交互作用(此作用可調節脊髓中的疼痛傳導)，產生止痛的作用。																																									
適應症	帶狀疱疹後神經痛、成人局部癲癇的輔助治療、纖維肌痛、糖尿病周邊神經病變引起的神經性疼痛																																									
用法用量	帶狀疱疹後神經痛：起始治療 75 mg bid，建議劑量 75 mg bid-200 mg tid 成人局部癲癇的輔助治療：起始治療 75 mg bid，建議劑量 150-600 mg/天 纖維肌痛：起始治療 75 mg bid，建議劑量 300-450 mg/天 糖尿病周邊神經病變引起的神經性疼痛：起始治療 75 mg bid，極量 150 mg bid																																									
腎功能劑量調整	<table><tr><td>Ccr (ml/min)</td><td colspan="4">每日劑量(mg/day)</td><td>用法</td></tr><tr><td>≥60</td><td>150</td><td>300</td><td>425</td><td>600</td><td>bid-tid</td></tr><tr><td>30-60</td><td>75</td><td>150</td><td>225</td><td>300</td><td>bid-tid</td></tr><tr><td>15-30</td><td>25-50</td><td>75</td><td>100-150</td><td>150</td><td>qd-bid</td></tr><tr><td><15</td><td>25</td><td>25-50</td><td>50-75</td><td>75</td><td>qd</td></tr><tr><td>血液透析後 補充劑量</td><td>25 mg 或 50 mg</td><td>50mg 或 75 mg</td><td>75 mg 或 100 mg</td><td>100 mg 或 150 mg</td><td>st</td></tr></table>						Ccr (ml/min)	每日劑量(mg/day)				用法	≥60	150	300	425	600	bid-tid	30-60	75	150	225	300	bid-tid	15-30	25-50	75	100-150	150	qd-bid	<15	25	25-50	50-75	75	qd	血液透析後 補充劑量	25 mg 或 50 mg	50mg 或 75 mg	75 mg 或 100 mg	100 mg 或 150 mg	st
Ccr (ml/min)	每日劑量(mg/day)				用法																																					
≥60	150	300	425	600	bid-tid																																					
30-60	75	150	225	300	bid-tid																																					
15-30	25-50	75	100-150	150	qd-bid																																					
<15	25	25-50	50-75	75	qd																																					
血液透析後 補充劑量	25 mg 或 50 mg	50mg 或 75 mg	75 mg 或 100 mg	100 mg 或 150 mg	st																																					
懷孕分級	C 級																																									
藥物動力學	吸收：生體可用率 ≥ 90% 分布：蛋白質結合率 0% 代謝：代謝量極少 排泄：腎 90-99% (原型) 半衰期：5-6.5 小時																																									
禁忌	對本品成份過敏																																									
注意事項	1.下列患者慎用：心衰竭 NYHA Class III and IV、腎功能不全 2.必須停藥時，應以至少一周的時間逐漸減量 3.服藥期間應監測是否出現抑鬱徵狀及(或)有自殺念頭 4.藥物交互作用：ketorolac (可能導致癲癇發作)																																									
副作用	頭暈、嗜睡、運動失調、視力模糊、體重增加、水腫、口乾、皮膚過敏																																									
健保類別	健保限制藥品，用於糖尿病周邊神經病變引起的神經性疼痛須自費(30 元/tab)																																									
健保規定	見附表																																									
健保價	24.6 元																																									
藥品儲存	儲存於 25℃ 以下																																									