


Recormon

藥品學名	Epoetin beta
商品名	英文：Recormon for injection，中文：容可曼注射劑
劑型含量	2000 IU/syr
廠牌	羅氏
許可證字號	衛署菌疫輸字第 000876 號
藥理作用	紅血球生成素是一種醣蛋白，可以刺激幹細胞腔中的前驅物生成紅血球。它可作為有絲分裂刺激因子以及分化賀爾蒙。
適應症	治療慢性腎衰竭且伴隨症狀性貧血病人。治療與癌症化學治療有關的貧血。治療正在接受抗腫瘤治療之多發性骨髓瘤、低度非何杰金氏淋巴瘤或慢性淋巴性白血病成人患者的症狀性貧血。
用法用量	SC 起始劑量：20 IU/kg*BW TIW 維持劑量：以 4 週為間隔，每週增加 20 IU/kg*BW TIW IV 起始劑量：40IU/kg*BW TIW 維持劑量：四週後增加到 80 IU/kg*BW TIW Maximum dose：每週 720 IU/kg*BW
肝腎功能劑量調整	腎功能不全：不須調整劑量 肝功能不全：無資料
懷孕分級	B
藥物動力學	吸收：Bioavailability：SC 23-24% 分布：無資料 代謝：無資料 半衰期：4-13 hrs(IV)·27h(SC)
禁忌	對本品過敏、靜脈血栓栓塞、無法控制的高血壓、近期內心肌梗塞、近期內中風、不穩定心絞痛患者
注意事項	1.下列患者慎用：進行 CABG 手術患者、 2.腎性貧血其治療目標值 10-12 g/dl。 3.在慢性腎臟病患者皮下注射可能增加 pure red cell aplasia(PRCA)之風險，如果治療期間出現血紅素驟降，需考慮是否副作用發生。 4.兩週內 Hb 增加速度>1 g/dl，會增加心血管疾病死亡之風險。 5.癌症患者可能增加死亡或腫瘤惡化或復發風險。 6.鐵質缺乏、感染、發炎或出血情形，可能影響血紅素生成反應
交互作用	無

G6PD/青光眼	無
副作用	高血壓、頭痛、血栓栓塞
健保類別	健保限制
藥品儲存	2-8°C，避光儲存
藥品外觀	 <p>Recormon® 容可曼® Epoetin beta 針筒裝注射液2000國際單位 2000 IU / 0.3 ml</p> <p>6 pre-filled syringes of 0.3 ml solution for injection 6 needles 27 G1/2</p> <p>Recormon® Epoetin beta 2000 IU / 0.3 ml</p> <p>6 pre-filled syringes of 0.3 ml solution for injection 6 needles 27 G1/2</p>