

Semaglutide

藥品學名	Semaglutide
商品名	英文：Rybelsus，中文：瑞倍適
劑型含量	14 mg/tab
廠牌	NovoNordisk
許可證字號	衛部菌疫輸字第 001171 號
藥理作用	腸泌素類荷爾蒙，攝取食物後分泌，會刺激胰臟分泌胰島素以及抑制昇糖素，延遲胃排空速度、讓人產生飽足感進而降低食慾。
適應症	<p>搭配飲食及運動療法，用於治療血糖控制不良的第二型糖尿病成人病人，以改善血糖控制</p> <ul style="list-style-type: none"> • 若病人因耐受不良或有禁忌症而不適合使用 metformin，可做為單一療法 • 與其他糖尿病藥物合併使用。
用法用量	1 tab QD AC(至少空腹 6-8 小時)
肝腎功能劑量調整	不須調整劑量
懷孕分級	C，仿單:不建議使用
藥物動力學	<p>吸收：Bioavailability, oral: 0.4% to 1%</p> <p>分布：Protein binding, plasma albumin: > 99%</p> <p>代謝：Via proteolysis and beta-oxidation</p> <p>排除：Renal excretion: Primary (3% unchanged)、Fecal excretion: Primary</p> <p>半衰期：1 week</p>
禁忌	本身或家族有髓質甲狀腺癌病史、罹患第二型多發性內分泌腫瘤症候群
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 下列患者慎用：胰臟炎、急性膽囊疾病、腎衰竭 2. 有胰臟炎病史的病人，應考慮使用其他抗糖尿病療法。 3. 不可用於 T1DM 或用於治療糖尿病酮酸中毒。 4. 搭配少量水(120ml 以下)空腹使用，應等待至少 30 分後再進行飲食或服用其他口服藥物。整粒吞服，不可剝開、壓碎或咀嚼。
交互作用	Hydroxychloroquine
G6PD/青光眼	無
副作用	低血糖、胃腸道不良反應、糖尿病視網膜病變併發症
健保類別	自費藥品
藥品儲存	30°C 以下儲存
藥品外觀	