

Sertraline

藥品學名	Sertraline
商 品 名	英文：Purtraline，中文：克憂寧
劑 型 含 量	50 mg/tab
廠 牌	瑞安藥品
許 可 證 字 號	衛部藥製字第 051728 號
藥 理 作 用	Selective serotonin reuptake inhibitor(SSRI)抗憂鬱劑
適 應 症	憂症、強迫症、恐慌症、創傷後壓力症候群、社交恐懼症及經前不悅症
用 法 用 量	每天服用一次。 憂症、強迫症:起始劑量 50 mg。 恐慌症、創傷後壓力症候群及社交恐懼症:起始劑量 25 mg，一週後增加至 50 mg/day。 最高劑量 200 mg/day。 經前不悅:起始劑量 50 mg/day，可以增加至 150 mg/day。
肝 腎 功 能 劑 量 調 整	肝功能不全：應使用較低劑量 腎功能不全：不需調整劑量
懷 孕 分 級	D 級
藥 物 動 力 學	吸收：幾乎全部 分布：蛋白結合率 98-99% 代謝：肝臟 排除：尿液 40-45%；糞便 40-45% 半衰期：24 h
禁 忌	服用其他MAO抑制藥或Pimozide病人
注 意 事 項	1.下列患者慎用：體液缺乏、老人、中重度肝功能不全、癲癇、未治療的狹角性青光眼。 2.停用時需漸進式停藥。
交 互 作 用	Linezolid、metoclopramide、aspirin、naproxen、piroxicam、diclofenac、tenoxicam、acemetacin、etoricoxib、celecoxib、ketoprofen、ketorolac、tramadol、warfarin、phenytoin、heparin、enoxaparin、zolpidem、desmopressin、prochlorperazine、amiodarone、famotidine、ciprofloxacin、fluconazole、sulpride、levofloxacin、quetiapine、donepezil、moxifloxacin、morphine、haloperidol、duloxetine、carvedilol、tamsulosin、bupropion、trazodone、escitalpram、edoxaban、rivaroxaban、tamoxifen、dextromethorphan、propafenone、dipyridamole、clopidogel、fentanyl、ritonavir、clarithromycin、nalbuphine、meperidine、vortioxetine、parecoxib、ibuprofen
G6PD/青光眼 注 意 事 項	青光眼慎重投予
副 作 用	胃腸不適、頭暈、頭痛、失眠、射精障礙、性功能障礙、無力
健 保 類 別	健保限制藥品 使用時病歷上應詳細註明診斷依據及使用理由。
健 保 價	5.3 元/tab
藥 品 儲 存	25°C 以下儲存

藥品外觀

