

Sevikar 5/40 mg

藥品學名	Amlodipine/Olmesartan
商品名	英文：Sevikar，中文：舒脈康
劑型含量	5/40 mg tab
廠牌	台灣第一三共
許可證字號	衛部藥輸字第 026520 號
藥理作用	Amlodipine : dihydropyridine 鈣拮抗劑，抑制鈣離子穿越細胞膜進入血管平滑肌和心肌。 Olmesartan : 血管收縮素 II 受體阻斷劑，阻斷血管收縮素 II 的血管收縮作用。
適應症	治療高血壓，此複方藥品不適合用於起始治療。
用法用量	起始劑量為 5/20 mg，每天一次。2 週後可增加劑量(舒脈康膜衣錠 5/40 毫克)。最高建議劑量是 10/40 mg。
肝腎功能劑量調整	無
懷孕分級	D，懷孕須立即停用
藥物動力學	吸收：身體可用率 Amlodipine 64-90%；Olmesartan 26% 分布：蛋白結合率 Amlodipine 93%；Olmesartan 99% 代謝：Amlodipine 肝 90%；Olmesartan GI tract: 100% 排除：Amlodipine 10% unchanged 60% metabolites；Olmesartan 腎臟 35-50% 半衰期：Amlodipine 30-52 h；Olmesartan 13 h
禁忌	使用aliskiren治療之糖尿病患者
注意事項	1.下列患者慎用：孕婦、體液不足或鹽分不足、肝腎功能不全、慢性腹瀉型腸病、重度阻塞性冠狀動脈疾病、電解質不平衡。 2. ACEIs 及 ARBs 不應合併使用於糖尿病腎病變病人。 3.合併使用 ACEIs、ARBs 或含 aliskiren 成分藥品，會增加低血壓、高鉀血症及腎功能下降(包括急性腎衰竭)之風險。
交互作用	Amlodipine : clopidogrel、simvastatin、fluconazole、clarithromycin、diltiazem、digoxin、rifampin、ritonavir Olmesartan : captopril、fosinopril、sacubitril、trimethoprim (Baktar)、furosemide、potassium citrate
G6PD/青光眼	無
副作用	低血壓、眩暈、頭痛、高血鉀、血管性水腫、腹瀉。
健保類別	健保給付藥品
健保價	16.3 元/tab
藥品儲存	25°C 以下儲存

藥品外觀

