

Sildenafil

藥品學名	Sildenafil orodispersible tablets
商品名	英文：Viagra，中文：威而鋼口溶錠
劑型含量	口溶錠 50 mg/tab
廠牌	輝瑞
許可證字號	衛署藥輸字第 026295 號
藥理作用	選擇性抑制陰莖海綿體中 PDE5：減少 cGMP 之分解，導致平滑肌鬆弛和血管擴張。
適應症	成年人勃起功能障礙
用法用量	性行為前 1 小時服用，50-100 mg 飯前服用
肝腎功能劑量調整	腎功能不全 Ccr< 30 ml/min：起始劑量 25 mg 肝功能不全：起始劑量 25 mg
懷孕分級	B 級
藥物動力學	吸收：生體可用率 41% 分布：蛋白質結合率 96% 代謝：肝(CYP3A4) 排泄：糞便 80%，尿液 13% 半衰期：3-5h
禁忌	間歇性或常規性併用 nitrate/tenofovir/HIV protease 抑制劑
注意事項	1. 下列患者慎用：心衰竭、不穩定心絞痛、加重血管擴張副作用(姿勢性低血壓、fluid depletion、自主神經功能異常、嚴重左心室輸出阻塞)、高血壓(>170/110 mmHg)、低血壓(<90/50 mmHg)、過去半年有 MI/stroke/致命心律不整、鐮刀型貧血引起之肺高血壓、陰莖畸形、可能導致陰莖異常勃起(鐮刀型貧血、多發性骨髓瘤、白血病)、併用 strong CYP3A4/PDE5 抑制劑。 2. 藥物交互作用：clarithromycin、fluconazole。 3. 老人、肝腎功能不全應減量使用。
副作用	潮紅、頭痛、胃腸不適、視覺異常、藍光幻覺、視覺模糊
健保類別	自費
健保價	無
藥品儲存	30°C 以下
外觀	