

Tadalafil

藥品學名	Tadalafil
商品名	英文：NicePower，中文：健力仕
劑型含量	5 mg /tab
廠牌	南光
許可證字號	衛署藥製字第 059862 號
藥理作用	Tadalafil 為抑制 PDE5 造成 cGMP 的濃度增加，而增強勃起功能。一氧化氮必須藉由性刺激才能造成局部釋出，若無性刺激，則 tadalafil 沒有抑制 PDE5 的作用。
適應症	治療勃起功能障礙、良性攝護腺肥大症所伴隨的下泌尿道症狀
用法用量	2.5-5 mg QD
肝腎功能劑量調整	Ccr <30 ml/min：不建議使用、Ccr 30-50 ml/min：建議起始劑量 2.5 mg 嚴重肝功能不全：不建議使用
懷孕分級	無資料
藥物動力學	吸收：Bioavailability：Well-absorbed 分布：Protein binding：94% 代謝：Hepatic：CYP3A4 排除：腎：36%、糞便：61% 半衰期：15-35 h
禁忌	間歇性或常規性併用nitrate、使用guanylate cyclase stimulator (如riociguat)患者
注意事項	1. 下列患者慎用：心血管疾病、6 個月內中風、肝腎功能不全、併用強效 CYP3A4 抑制劑、乳糖不耐症 2. 交互作用：Isosorbide-5-mononitrate、NTG、dipyridamole、theophylline、ritonavir、terazosin、clarithromycin、voriconazole、simvastatin、tamsulosin。 3. 若服用後持續勃起超過 4 小時應立即尋求醫療協助。
副作用	潮紅、頭痛、胃腸不適、肌痛、心絞痛、心肌梗塞、心悸、Stevens-Johnson syndrome、視覺模糊
健保類別	自費藥品
藥品儲存	25°C 以下儲存
藥品外觀	