

Teicoplanin

藥品學名	Teicoplanin
商品名	英文：Teiyu，中文：得癒
劑型含量	400 mg/vial
廠牌	台裕化學
許可證字號	衛署藥製字第 052565 號
藥理作用	與細胞壁 peptidoglycan 結合，阻礙細胞壁合成。主要針對革蘭氏陽性菌，尤其對耐藥的金黃色葡萄球菌和耐 Methicillin 表皮葡萄球菌的感染有效。
適應症	葡萄球菌感染所致之心內膜炎、骨髓炎、肺炎、敗血病、軟組織感染、腸炎、梭狀桿菌感染所致之假膜性結腸炎
用法用量	一般感染 起始劑量：400 mg (6 mg/kg) q12h*3 doses 維持劑量：400 mg (6 mg/kg) qd Osteomyelitis、Endocarditis 起始劑量：600-800 mg(12 mg/kg) q12h*3 doses 維持劑量：600-800 mg (12 mg/kg) qd
肝腎功能劑量調整	Ccr 40-60 ml/min:前三天不需調整劑量，第四天劑量 1/2 dose 或給藥間隔延長 2 倍 Ccr<40 ml/min(含 HD):前三天不需調整劑量，第四天劑量 1/3 dose 或給藥間隔延長 3 倍
懷孕分級	無數據
藥物動力學	吸收：IM 生體可用率 90 % 分布：蛋白結合率 87.6-90.8 % 排泄：腎 80 %，糞便 2.7 % 半衰期：100-170 h
禁忌	對此成分過敏患者
注意事項	1.腎功能不全者應調整用法用量。 2.下列患者慎用：腎功能不全、孕婦。 3.併用耳毒性藥物會增加毒性反應。
副作用	低血壓伴隨臉色潮紅及皮疹(red man syndrome)、腎衰竭、血小板減少
健保類別	健保給付藥品
健保價	1454 元
藥品儲存	30℃ 以下
藥品外觀	