

Ticagrelor

藥品學名	Ticagrelor
商品名	英文：Brilinta，中文：百無凝
劑型含量	90 mg/tab
廠牌	AstraZeneca
許可證字號	衛署藥輸字第 025691 號
藥理作用	選擇性抑制血小板 P2Y ₁₂ ADP 受體：抑制血小板凝集。
適應症	Ticagrelor 與 Aspirin 併用，可減少急性冠心症患者栓塞性心血管事件發生。與 Clopidogrel 相比，Ticagrelor 可降低心血管死亡、心肌梗塞發生率。於中風事件上，兩者無差異。對於接受經皮冠狀動脈介入治療，Ticagrelor 可減少支架栓塞的發生。
用法用量	180 mg st then 90 mg BID
肝腎功能劑量調整	嚴重肝功能不全不建議使用
懷孕分級	C 級
藥物動力學	吸收：生體可用率 36% 分布：蛋白質結合率 99% 代謝：肝臟 CYP3A4 排泄：腎臟 26%、糞便 58% 半衰期：7 hr
禁忌	顱內出血病史、活動性病理性出血
注意事項	1. 下列患者慎用：嚴重肝功能不全。 2. 藥物交互作用：strong CYP3A4 inducer、strong CYP3A4 inhibitor、colchicine、fluconazole、dipyridamole、fentanyl、morphine、amiodarone、aspirin。 3. 手術前建議 5 天前停用。 4. 與 Aspirin 併用時，Aspirin 應避免每天超過 100 mg。
副作用	出血、肌酸酐增加、呼吸困難
健保類別	健保限制藥品
健保規定	限用於已發作之急性冠心症(包括不穩定型心絞痛、非 ST 段上升型心肌梗塞或 ST 段上升型心肌梗塞)而住院的病人時，得與 Aspirin 合併治療，最長 9 個月。需於病歷註明住院時間。
健保價	31.2 元
藥品儲存	30°C 以下
外觀	