Tisseel 組織膠

藥品學名	Sealer protein 溶液+ Thrombin 溶液
商品名	英文：Tisseel solution for sealant，中文：百特組織修復凝合劑
劑型含量	Sealer protein 溶液，每 ml: human fibrinogen 91 mg/ml, aprotinin 3000 KIU/ml Thrombin 溶液，每 ml:human thrombin 500 IU/ml, calcium chloride 40 mcg/ml
廠牌	AstraZeneca
許可證字號	衛署菌疫輸第 0925 號
藥理作用	模仿人體凝血過程的最後步驟達到局部止血
適應症	標準手術技術不足時的輔助療法，協助止血。
用法用量	需要量及使用頻率，應依據病人的臨床狀況決定。 一包 2 ml 的 Tisseel 應足以披覆至少 10 平方公分的面積 (亦即 1 ml 的 Tissell 溶液加上 1 ml 的 Thrombin 溶液)
肝腎功能劑量調整	無劑量調整建議
懷孕分級	無資料
藥物動力學	傷口表面使用 無藥物動力學相關研究
禁忌	單獨使用於大量和急速的動脈或靜脈出血、不適用於取代關閉外科傷口的皮膚縫合線、不得使用於血管內(使用於血管內可能產生血栓性栓塞導致生命危險)
注意事項	1.僅限使用於創傷表面，勿血管內投予使用。 2.使用加壓氣體塗抹纖維蛋白密合劑溶液時必須謹慎注意。 3.僅塗抹薄薄的一層即可，過多的凝塊厚度可能對產品功效與傷口癒合過程產生負面影響。 4.使用前先從套管擠出最初幾滴藥品並丟棄勿用，以確保蛋白粘合劑和凝血酶溶液充分混合。 5.使用本產品前，需以標準技術使傷口表面乾燥。 6.每次投予本劑時，應記錄品名及批號。
副作用	術後傷口感染、感覺異常、腋靜脈血栓、過敏反應、肢體疼痛、術後疼痛、發燒、血清腫
健保類別	自費
自費價	20800 元
藥品儲存	冷凍 <-20℃以下
藥品外觀