

Trospium chloride

藥品學名	Trospium chloride					
商 品 名	英文：Uracare 中文：悠尿可錠					
劑 型 含 量	10 mg/tab					
廠 牌	衛達					
許可證字號	衛署藥製字第 050008 號					
藥 理 作 用	平滑肌鎮痙藥物					
衛生署核可適應症	平滑肌痙攣緩解及鎮痛					
用 法 用 量	膀胱過動症:10-20 mg bid 飯前 1 小時 其他疾病:10-20 mg bid-tid 飯前 1 小時					
懷 孕 分 級	C					
藥物動力學	吸收：生體可用率 9.6% 分布：蛋白質結合率 50%-85% 代謝：肝 排泄：糞便(85.2%) 半衰期：18h					
禁 忌	青光眼、排尿障礙、胃滯留者					
注 意 事 項	1. 下列患者慎用：前列腺肥大、幽門狹窄病患 2. 腎功能不佳 Clcr< 30ml/min 不建議使用 3. 避免在服藥 2 小時前後使用酒精					
副 作 用	口乾(10.7-21%)、便秘(8.5-9.6%)、嗜睡、排尿障礙					
健保類別	健保給付藥品					
健保規定	-					
健 保 價	6.5 元					
藥品儲存	儲存於 25℃ 以下					
總 結	院內現有類似藥品之比較					
	分類	Anticholinergic agents	Anticholinergic agents	Anticholinergic agents	anticholinergic ,calcium-antagonist	antispasmodic agent ^d
	學名	Trospium	Oxybutynin	Solifenacin	Propiverine	Flavoxate
	劑量	10mg	5mg	5mg	15mg	200mg
	健保價	6.5	9.4	37.4	8.7	6
	常用劑量	10-20mg bid	5mg qd Max:30mg/d	5mg qd	5mg tid-15mg qid	100-200mg tid-qid
	每日藥費	13-26	9.4	37.4	8.7-34.8	12-24
	月用量	新藥申請	新藥申請	481	1491	1290
	代謝	肝	肝 CYP3A4	肝 CYP3A4	肝 CYP3A4	-
	懷孕分級	C	B	C	-	B
	備註	4 級胺	3 級胺	3 級胺 M3 antagonist	3 級胺	
	^d :via phosphodiesterase inhibition and possibly by calcium antagonistic activity					