

Truvada

藥品學名	Emtricitabine + tenofovir
商品名	英文：Truvada · 中文：舒發泰膜衣錠
劑型含量	每錠含：Emtricitabine 200 mg、Tenofovir 300 mg
廠牌	Gilead
許可證字號	衛署藥輸字第 024769 號
藥理作用	Emtricitabine：cytidine 核甘類似物，抑制 HIV-1 reverse transcriptase 活性；Tenofovir 為 adenosine 類似物，抑制 HIV-1 reverse transcriptase 活性。
適應症	適用於與其他抗反轉錄病毒藥物合用於成人 HIV-1 感染治療。適用於在合併採取安全性行為下進行暴露前預防性投藥(PrEP)，以降低高危險成人發生性傳染性 HIV-1 感染的風險。
用法用量	暴露前預防(暴露前 2-24 小時服用 2 顆，第一次服藥後 24、48 小時各一顆)，暴露後預防服用 28 天。
肝腎功能劑量調整	Ccr 30-49 ml/min：1 tab Q48h Ccr <30 ml/min：避免使用
懷孕分級	B
藥物動力學	吸收：生體可用率 Emtricitabine 92%；Tenofovir 25% 分布：蛋白結合率 Emtricitabine < 4%；Tenofovir < 0.7% 代謝：Emtricitabine 肝 13%；Tenofovir 肝 minimal 排泄：Emtricitabine 腎 86%；Tenofovir 腎 70%-80% 半衰期：Emtricitabine 10 hours；Tenofovir 17 hours
禁忌	並非 HIV 治療藥物，僅可與其他抗反轉錄病毒藥物合併使用治療 HIV 病毒感染。
注意事項	1. 下列患者慎用：肝硬化、末期肝病、輕中度腎功能不全。 2. 藥品交互作用: Acemetacin、Aspirin、Celecoxib、Diclofenac、Etoricoxib、Ketoprofen、Ketorolac、Mefenamic Acid、Naproxen、Parecoxib、Tenoxicam、Aceclofenac、Lysine Acetylsalicylate。 3. 使用前建議監測是否有 HBV 感染。
副作用	胃腸不適、頭痛、疲倦、失眠、皮疹
健保類別	自費(暴露前預防、暴露後預防使用)
自費價	400 元
藥品儲存	30°C以下
藥品外觀	

