

Varenicline

藥品學名	Varenicline									
商品名	英文：Champix，中文：戒必適									
劑型含量	0.5 mg/tab、1mg/ tab									
廠牌	輝瑞									
許可證字號	衛署藥製字第 024649/024648 號									
藥理作用	Varenicline 是 $\alpha_4\beta_2$ 神經元尼古丁乙醯膽鹼受體促效劑，可抑制尼古丁活化 $\alpha_4\beta_2$ 神經元尼古丁乙醯膽鹼受體，同時刺激中樞神經中邊緣多巴胺系統，減輕尼古丁成癮及戒斷症候。									
適應症	戒菸輔助劑									
用法用量	<p>病人應預設一個停止吸菸的日期，並在這個日期之前一週開始投藥 (或病人可在開始服用 CHAMPIX 後的第 8-35 天之間停止吸菸)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">療程 12 周</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">D1-3</td> <td style="text-align: center;">0.5mg QD</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D4-7</td> <td style="text-align: center;">0.5mg BID</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D8 起</td> <td style="text-align: center;">1mg BID</td> </tr> </tbody> </table>		療程 12 周		D1-3	0.5mg QD	D4-7	0.5mg BID	D8 起	1mg BID
療程 12 周										
D1-3	0.5mg QD									
D4-7	0.5mg BID									
D8 起	1mg BID									
肝腎功能劑量調整	腎功能不全	Ccr < 30 ml / min：最大劑量 0.5mg BID								
		接受血液透析的 ESRD 病人：最大劑量 0.5mg QD								
	肝功能不全	無須調整劑量								
懷孕分級	C									
藥物動力學	1.吸收：Bioavailability：>90% 2.分布：Protein binding: 20% or less 3.代謝：代謝程度極微 4.排除：Renal: 92% unchanged 5.半衰期：24-31.5 hrs									
禁忌	對本品產生嚴重過敏反應或皮膚反應的病人									
注意事項	1.下列患者慎用：心血管疾病、癲癇。 2.若出現情緒激動、情緒低落、行為改變、自殺意念或行為時，應停藥。 3.服藥期間於駕駛或操作機械或參與其他具潛在危險性活動時宜小心謹慎。 4.服藥期間不宜飲酒。 5.Varenicline 只補助於單獨使用不得與其他尼古丁藥物（如貼片）的合併使用。									
交互作用	Bupropion									
G6PD/青光眼	無									
副作用	失眠、頭痛、咳嗽、腸胃不適、憂鬱									
健保類別	戒菸服務補助計畫用藥									

藥品儲存	儲存於 25°C 以下
藥品外觀	