

Vinorelbine

藥品學名	Vinorelbine
商品名	英文：Navelbine 中文：溫諾平
劑型含量	20 mg/cap
廠牌	友華
許可證字號	衛署藥輸字第 024269 號
藥理作用	半合成长春花鹼：選擇性抑制 polymerization of tubulin dimers into microtubules，產生 cytotoxic effects
適應症	非小細胞肺癌、轉移性乳癌
用法用量	50-160 mg/週 -前三週 60 mg/m ² qw -嗜中性白血球 ≥ 1000 或 500-1000 次數 ≤ 1 次第四週開始使用 80 mg/m ² qw -若嗜中性白血球 < 500 或 500-1000 次數 ≥ 2 次，則劑量須改為 60mg/m ² qw -極量：60 mg/m ² qw~120 mg/週、80 mg/m ² qw~160 mg/週
懷孕分級	D 級
藥物動力學	吸收：26 - 45% 分布：60 - 91.2% 代謝：肝 排泄：腎(11%)、膽汁(50%) 半衰期：24-56 小時
禁忌	顆粒性白血球減少症：granulocyte < 1,000 cells/mm ³
注意事項	1.下列患者慎用：顆粒性白血球 1,000-1,499 cells/mm ³ 、骨髓/肝功能不全、神經病變、併用 CYP3A inhibitors/ paclitaxel、曾接受放射線治療 2.藥物交互作用：rotavirus vaccine、live vaccine、itraconazole、clarithromycin 3.肝功能不全須調降劑量 4.本品必須整顆吞服，不可嚼食或剝開膠囊 5.服藥後數小時內有嘔吐情形，勿重複服用
副作用	嗜中性白血球減少症、腸胃不適、禿髮、運動神經失調
健保類別	健保限制藥品
健保規定	限用於晚期或無法手術切除之非小細胞肺癌及轉移性乳癌病患，且本成分之口服劑型與注射劑型不得併用。
健保價	2600 元
藥品儲存	儲存溫度為 2- 8℃
總結	本院現有使用病人數：2 位，每月藥費 31200 元/人。