

Vytorin

商 品 名	Vytorin，維妥力
成 分 含 量	每 tab 含： Ezetimibe 10 mg Simvastatin 20 mg
廠 牌	默沙東
許可證字號	衛署藥輸字第 024250 號
藥 理 作 用	Ezetimibe：作用於小腸刷狀邊緣，抑制膽固醇的吸收 Simvastatin：HMG-CoA 還原酶抑制劑，抑制膽固醇的合成
適 應 症	原發性高膽固醇血症、同型接合子家族性高膽固醇血症
用 法 用 量	每日服用一次
懷 孕 分 級	X級
藥 物 動 力 學	吸收：生體可用率 Ezetimibe 缺乏資料；Simvastatin < 5% 分布：蛋白質結合率 Ezetimibe > 90%；Simvastatin：95% 代謝：肝 排泄：Ezetimibe > 腎 11%，糞便 78%；Simvastatin 腎 13%，糞便 60% 半衰期：Ezetimibe 22 小時；Simvastatin 缺乏資料
禁 忌	活動性肝病、不明原因 GOT、GPT 上升、孕婦
注 意 事 項	1. 下列患者慎用：酒精成癮者、肝腎功能不全、大型手術 2. 藥物交互作用： Amiodarone、Azithromycin、Clarithromycin、Danazol、Erythromycin、 Fenofibrate、Fluconazole、Ketoconazole、Verapamil、Warfarin 3. 10 歲以下兒童不宜使用 4. 有肌病或橫紋肌溶解的症狀需停藥
副 作 用	肌肉疼痛、頭痛、上呼吸道感染、感冒症狀、橫紋肌溶解
健 保 類 別	健保限制藥品
健 保 規 定	限用於原發性高膽固醇血症、同型接合子家族性高膽固醇血症(HOFH)病患 並符合全民健康保險降血脂藥物給付規定表者。
健 保 價	44.53 元
藥 品 儲 存	30°C 以下密閉儲存
藥 物 外 觀	